

# Informe Final Control Cuota Algas pardas III y IV región, año 2017


**Huiro Negro (*Lessonia berteriana/spicata*), Huiro  
Palo (*Lessonia trabeculata*) y Huiro Macro  
(*Macrocystis pyrifera*)**




**Unidad de Control de Cuotas  
SUBDIRECCION DE PESQUERIAS  
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA**

**Enero 2018**

**1. Cuota global de captura y fraccionamientos algas pardas año 2017.**



**Figura 1.** Fraccionamiento de la cuota algas pardas III región, año 2017. (DEC. EX. N° 150 y DEC. EX. N° 569-17)



**Figura 2.** Fraccionamiento de la cuota algas pardas IV región, año 2017 (DEC. EX. N° 328-17)

## 2. Normativa que estableció cuota y sus fraccionamientos

- a. **DEC. EX. N° 1-2017** Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la III Región. (Publicado en Página web 10-01-2017) (F.D.O. 12-01-2017)
- b. **DEC. EX. N° 2-2017** Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la IV Región. (Publicado en Página web 10-01-2017) (F.D.O. 12-01-2017)
- c. **DEC. EX. N° 150-2017** Modifica Dec. Ex. N° 1-2017 Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la III Región. (Publicado en Página web 01-03-2017) (F.D.O. 03-03-2017)
- d. **RES. EX. N° 1237 de 28-03-2017** (D.O.17-04-2017), del Servicio, establece los Factores de Conversión y Estados de Humedad de Algas Pardas. Se aplica desde abril. En Marzo se imputan sólo el desembarque. (Factor 1)
- e. **DEC. EX. N° 328-2017** Modifica Dec. Ex. N° 2-2017 Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la IV Región. (Publicado en Página web 16-05-2017) (F.D.O. 17-05-2017)
- f. **RES. EX. N° 1831-2017** Establece Distribución Cuota de los Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Flotador en la IV Región, Año 2017. (Publicado en Página Web 02-06-2017) (F.D.O. 09-06-2017)
- g. **DEC. EX. N° 413-2017** Modifica Dec. Ex. N° 1-2017 Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la III Región. (Publicado en Página web 13-06-2017) (F.D.O. 16-06-2017)
- h. **RES. EX. SNP N° 3208 de 02-08-2017**, Modifica estado del Huiro Negro en la III región de semi-húmedo a húmedo en Formularios Recolectores de Orilla (07 mayo al 06 de junio)
- i. **RES. EX. N° 3602 de 02-08-2017 del SNP**, establece estados de humedad (4) y factores de conversión y deja sin efecto resolución exenta N° 1237, de fecha 28 de marzo de 2017.
- j. **DEC. EX. N° 569-2017** Modifica Dec. Ex. N° 1-2017 Establece Cuota de Captura Recursos Huiro Negro, Huiro Palo y Huiro Macro en la III Región. (Publicado en Página web 23-08-2017) (F.D.O. 26-08-2017)
- k. **RES. EX. N° 3830 de 17-08-2017 del SNP**, Se modifica el estado de humedad formularios de Recolectores (Semi-húmedo a Húmedo) del Huiro Palo, producto de las marejadas (varazón) en la III región en el mes de Julio.

## 3. Movimientos de Cuotas: Cesiones, arriendos, traspasos, etc. y Descuentos por Sanción.

- 3.1. Artesanal-Artesanal: No aplica
- 3.2. Artesanal-Industrial: No aplica
- 3.3. Industrial-Artesanal: No aplica
- 3.4. Industrial-Industrial: No aplica
- 3.5. Descuento por Sanción: No aplica

#### 4. Consumo de cuota global algas pardas año 2017.

**Tabla 1.** Consumo de la cuota global de algas pardas regiones III y IV año 2017. Datos en toneladas.

Región	Recurso	Cuota asignada	Captura	Saldo (t)	Consumo %
III Región de Atacama	Huiro Negro ( <i>Lessonia berteroaana/spicata</i> )	60306,000	61757,008	-1451,008	102,406%
	Huiro Palo ( <i>Lessonia trabeculata</i> )	14413,000	15656,278	-1243,278	108,626%
	Huiro Macro ( <i>Macrocystis pyrifera</i> )	10042,000	10556,573	-514,573	105,124%
IV Región de Coquimbo	Huiro Negro ( <i>Lessonia berteroaana/spicata</i> )	24026,000	16655,332	7670,668	69,320%
	Huiro Palo ( <i>Lessonia trabeculata</i> )	11656,000	12145,718	-489,718	104,20%
	Huiro Macro ( <i>Macrocystis pyrifera</i> )	3519,000	3696,292	-177,292	105,038%

#### 5. Detalle de Operación

##### 5.1. De la operación Artesanal

**Tabla 2.** Consumo de cuotas algas pardas en la III Región de Atacama, por menor nivel de fraccionamiento. Datos en toneladas

Región	Recurso	Distribución	Fraccionamiento	Cuota asignada	Captura	Saldo (t)	Consumo %
III Región de Atacama	Huiro Negro ( <i>Lessonia berteroaana/spicata</i> )	Regional III	Varado + Barreteado	21581,000	21102,158	478,842	97,78%
			Varado	38725,000	40654,850	-1929,850	104,98%
	Huiro palo ( <i>Lessonia trabeculata</i> )	Regional III	Barreteado	5923,000	5871,190	51,810	99,13%
			Varado	8490,000	9785,088	-1295,088	115,25%
	Huiro flotador regional ( <i>Macrocystis pyrifera</i> )	Regional III	Varado + Segado	1506,000	2705,022	-1199,022	179,62%
			Varado	775,000	1415,488	-640,488	182,64%
	Huiro flotador de Chasco ( <i>Macrocystis pyrifera</i> )	Chasco	Varado + Segado	6197,000	6252,059	-55,059	100,89%
			Varado	1561,000	184,004	1376,996	11,79%

**Tabla 3.** Consumo de cuotas algas pardas en la IV Región de Coquimbo, por menor nivel de fraccionamiento. Datos en toneladas

Región	Recurso	Distribución	Fraccionamiento	Cuota asignada	Captura	Saldo (t)	Consumo %
IV Región de Coquimbo	Huiro Negro ( <i>Lessonia berteroa/spicata</i> )	La Higuera- La Serena	Varado + Barreteado	1471,000	1139,570	331,430	77,469%
			Varado	1852,000	639,097	1212,903	34,508%
		Coquimbo	Varado + Barreteado	1547,000	1292,905	254,095	83,575%
			Varado	828,000	440,402	387,598	53,189%
		Ovalle	Varado + Barreteado	5278,000	5041,581	236,419	95,521%
			Varado	5091,000	2608,399	2482,601	51,236%
		Canela	Varado + Barreteado	1672,000	1205,572	466,428	72,104%
			Varado	958,000	822,288	135,712	85,834%
		Los Vilos	Varado + Barreteado	2700,000	1932,967	767,033	71,591%
			Varado	2629,000	1532,551	1096,449	58,294%
	Huiro palo ( <i>Lessonia trabeculata</i> )	La Higuera- La Serena	Varado + Barreteado	163,000	203,948	-40,948	125,121%
			Varado	12,000	20,960	-8,960	174,665%
		Coquimbo	Varado + Barreteado	865,000	869,377	-4,377	100,506%
			Varado	51,000	0,081	50,919	0,159%
		Ovalle	Varado + Barreteado	4738,000	4769,342	-31,342	100,662%
			Varado	285,000	355,940	-70,940	124,891%
		Canela	Varado + Barreteado	2537,000	2601,015	-64,015	102,523%
			Varado	152,000	378,035	-226,035	248,708%
		Los Vilos	Varado + Barreteado	2692,000	2767,604	-75,604	102,808%
			Varado	161,000	179,416	-18,416	111,438%
	Huiro flotador ( <i>Macrocystis pyrifera</i> )	La Higuera- La Serena	Varado + Segado	4,000	9,273	-5,273	231,831%
			Varado	1,000	3,580	-2,580	358,000%
		Coquimbo	Varado + Segado	240,000	164,931	75,069	68,721%
			Varado	97,000	9,570	87,430	9,866%
Ovalle		Varado + Segado	1757,000	2458,059	-701,059	139,901%	
		Varado	703,000	6,727	696,273	0,957%	
Canela		Varado + Segado	212,000	325,882	-113,882	153,718%	
		Varado	85,000	73,166	11,834	86,078%	
Los Vilos		Varado + Segado	300,000	563,811	-263,811	187,937%	
		Varado	120,00	81,293	38,707	67,744%	